



兒童鎮靜後 注意事項

廖健強

麻醉專科醫師



舒美麻醉

醫療團隊 ANESTHESIA
MEGACOMFORT



要陪伴



起床氣



嘴巴怪



坐著吃



看活力



舒美麻醉
醫療團隊 ANESTHESIA
MEGACOMFORT



要陪伴

麻醉恢復期，小朋友會睡睡醒醒，建議睡在有圍欄的床或是打地鋪，避免跌落受傷。至少前六小時，家長需持續陪在小朋友身邊，隨時觀察恢復狀況並及早發覺異狀。

另外，雖然清醒的時間會越來越長，**走路可能還不穩**，家長請特別留意，且避免當日再出門玩耍。



舒美麻醉

醫療團隊 ANESTHESIA MEGACOMFORT



起床氣

醒來後一小時內，小朋友仍會有點像酒醉茫茫的狀態，容易有**耍脾氣和肢體揮舞**的情形，但隨著麻醉藥物持續代謝就會很快改善。

家長只需耐心安撫、小心防護，避免受傷即可。



舒美麻醉

醫療團隊 ANESTHESIA MEGACOMFORT



嘴巴怪

由於牙齦有注射局部麻醉藥，加上治療項目多少會造成口腔不適，小朋友的感受力慢慢恢復時，常會有**手指摳抓牙齒以及咬嘴唇**的動作。

家長請一定要及時阻止，避免造成新的傷口。



舒美麻醉

醫療團隊

ANESTHESIA
MEGACOMFORT



坐著吃 1/2

小朋友不清醒時，絕對不可以
餵食任何東西。

恢復到能夠自己穩定坐著時，
就可以小口喝水來確認吞嚥正
常不會噎到，然後就可以開始
喝營養的流質食物（如豆漿、
乳製品）。





坐著吃 2/2

固體食物，要等小朋友自己說嘴巴不會麻，或是治療結束兩個小時後，口內麻醉藥幾乎都退掉時才可以吃，不然有可能在咀嚼的時候咬到臉頰、舌頭或是嘴唇。





看活力

小朋友的免疫系統比較敏感，牙科治療的微小傷口就常引起輕度發燒，因此治療後兩天內會有體溫稍高的情況，屬於正常的生理反應，可多補充水分。

如果小朋友活力明顯下降、畏寒顫抖，或是體溫到第三天仍超過38度，可能是感染惡化的早期症狀，家長需盡快找小兒科醫師進行評估。



舒美麻醉

醫療團隊

ANESTHESIA
MEGACOMFORT



舒美麻醉

醫療團隊 ANESTHESIA MEGACOMFORT